

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο

- A.** Θεωρία σελ. 217
B. Θεωρία σελ. 247
Γ. α. Σωστό β. Σωστό γ. Σωστό
δ. Λάθος (βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική παράσταση)
ε. Λάθος (π.χ. $f(x)=x^3$ στο $(-1,1)$)

ΘΕΜΑ 2ο

- α.** $w = 3z - i\bar{z} + 4 = 3(\alpha + \beta i) - i(\alpha + \beta i) + 4 = 3(\alpha + \beta i) - i(\alpha - \beta i) + 4 =$
 $= 3\alpha + 3\beta i - \alpha i - \beta + 4 = 3\alpha - \beta + 4 + (3\beta - \alpha)i.$
 Άρα: $\text{Re}(w) = 3\alpha - \beta + 4$, $\text{Im}(w) = 3\beta - \alpha.$
- β.** Για να κινούνται οι εικόνες του z στην ευθεία με εξίσωση $y=x-2$ πρέπει να ισχύει : $\beta = \alpha - 2$
 Όμως οι εικόνες του w στο μιγαδικό επίπεδο κινούνται στην ευθεία με εξίσωση $y=x-12$, οπότε ισχύει :
 $3\beta - \alpha = 3\alpha - \beta + 4 - 12 \Leftrightarrow 3\beta + \beta = 3\alpha + \alpha - 8 \Leftrightarrow 4\beta = 4\alpha - 8 \Leftrightarrow \beta = \alpha - 2$

γ. 1ος τρόπος

Εάν $z = \alpha + \beta i$ τότε $|z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. Εφόσον ζητάμε ο z να έχει ελάχιστο μέτρο αρκεί ο $|z|^2$ να γίνει ελάχιστο. Όμως οι εικόνες του z κινούνται πάνω στην ευθεία με εξίσωση $y=x-2$, οπότε $\beta = \alpha - 2$ και $z = \alpha + (\alpha - 2)i$.

Άρα $|z|^2 = \alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + (\alpha - 2)^2$. Έστω η συνάρτηση :

$$f(x) = x^2 + (x-2)^2 \Leftrightarrow f(x) = x^2 + x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow f(x) = 2x^2 - 4x + 4, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$


Είναι : $f'(x) = 4x - 4$ και έχουμε τον διπλανό πίνακα :

Η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 1$ που είναι $f(1) = 2 - 4 + 4 = 2$.

Επειδή $|z|^2 = f(\alpha)$, ο μιγαδικός με το ελάχιστο μέτρο είναι αυτός που προκύπτει για $\alpha = 1$, δηλαδή $z = 1 - i$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		2 ελάχ.	

2ος τρόπος



Εάν $M(\alpha, \beta)$ είναι η εικόνα του μιγαδικού z τότε το $|z| = (OM)$ και M σημείο της ευθείας $y=x-2$.

Εφόσον ζητείται το OM να γίνει ελάχιστο πρέπει το OM να είναι κάθετο στην ευθεία $y=x-2$.

Ο ζητούμενος μιγαδικός είναι το κοινό σημείο των ευθειών ε και OM . $\lambda_\varepsilon = 1$ και επειδή $\varepsilon \perp OM$ είναι $\lambda_{OM} \cdot \lambda_\varepsilon = -1 \Leftrightarrow \lambda_{OM} = -1$.

Άρα OM : $y = -x$. Οπότε :

$$\begin{cases} y = -x \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ -x = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ -2x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = 1 \end{cases} \text{ άρα } z = 1 - i$$

ΘΕΜΑ 3ο

Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^5 + x^3 + x$.

α. Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πολυωνυμική με $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = 20x^3 + 6x = 2x(10x^2 + 3) \text{ και είναι :}$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2x(10x^2 + 3) > 0 \Leftrightarrow x > 0 \text{ (αφού } 10x^2 + 3 > 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R})$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2x(10x^2 + 3) < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Οπότε η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 0]$ και κυρτή στο $[0, +\infty)$. Επίσης έχει σημείο καμπής το $(0, 0)$.

Για να είναι η f αντιστρέψιμη πρέπει να είναι 1-1. Επειδή είναι γνησίως αύξουσα τότε θα είναι και 1-1 (Σχολικό Βιβλίο σελ. 153)

β. Έστω η συνάρτηση $g(x) = e^x - (1+x)$, $x \in \mathbb{R}$

Η g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $g'(x) = e^x - 1$ και

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0 \text{ και}$$

$$g'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$$

Από τον πίνακα προσήμου φαίνεται ότι η g έχει ολικό ελάχιστο για $x = 0$ το $g(0)$.

Οπότε: $g(x) \geq g(0) \Leftrightarrow e^x - (1+x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 1+x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Οπότε: } e^x \geq 1+x \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} f(e^x) \geq f(1+x)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\swarrow$	0 ελάχ.	$\nearrow$

γ. Γνωρίζουμε ότι ο άξονας συμμετρίας των γραφικών παραστάσεων της f και της f^{-1} είναι η ευθεία $y = x$.

Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $(0,0)$ είναι :
 $y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 0 = 1 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y = x$, αφού $f(0) = 0$ και $f'(0) = 1$

δ. 1ος τρόπος

Θα βρούμε τα κοινά σημεία της $C_{f^{-1}}$ με τον $x'x$. Εφόσον το $(0,0)$ είναι πάνω στον άξονα συμμετρίας $y = x$ άρα είναι σημείο των C_f και $C_{f^{-1}}$. Δηλαδή η $C_{f^{-1}}$ τέμνει τον $x'x$ στο $(0,0)$. Δεν υπάρχει άλλο κοινό σημείο της $C_{f^{-1}}$ με τον $x'x$, γιατί η f^{-1} είναι 1-1.

Οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι : $E = \int_0^3 |f^{-1}(y)| dy$

Η f και η f^{-1} έχουν το ίδιο είδος μονοτονίας, άρα και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Για $y \geq 0 \Leftrightarrow f^{-1}(y) \geq f^{-1}(0) \Leftrightarrow f^{-1}(y) \geq 0$, οπότε $E = \int_0^3 f^{-1}(y) dy$.

Θέτουμε $x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow f(x) = y \Leftrightarrow y = x^5 + x^3 + x$ και $dy = (5x^4 + 3x^2 + 1)dx$

Για $y = 0 \Rightarrow x^5 + x^3 + x = 0 \Leftrightarrow x(x^4 + x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ και


για $y = 3 \Rightarrow x^5 + x^3 + x = 3 \Leftrightarrow x^5 + x^3 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow$ (Σχήμα Horner)

$\Leftrightarrow (x - 1)(x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1(*)$

Άρα : $E = \int_0^3 f^{-1}(y) dy = \int_0^1 x(5x^4 + 3x^2 + 1) dx = \int_0^1 (5x^5 + 3x^3 + x) dx =$

$$= \left[\frac{5x^6}{6} + \frac{3x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{5}{6} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} + \frac{6}{12} = \frac{25}{12} \text{ τ.μ.}$$

2ος τρόπος



Οι C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$. Επομένως το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x=3$ είναι ίσο με το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την C_f τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $y=3$.

Η f είναι κυρτή στο $[0, +\infty)$ οπότε η C_f είναι πάνω από την εφαπτομένη $y=x$, ενώ η συμμετρική $C_{f^{-1}}$ είναι κάτω από την $y=x$.

Τα κοινά σημεία των C_f και $y=3$ είναι:

$f(x) = 3 \Leftrightarrow x^5 + x^3 + x = 3 \Leftrightarrow x^5 + x^3 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow$ (Σχήμα Horner)

$\Leftrightarrow (x - 1)(x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1(*)$

Οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι :

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^1 |3 - f(x)| dx = \int_0^1 (3 - f(x)) dx = \int_0^1 [3 - (x^5 + x^3 + x)] dx = \int_0^1 (-x^5 - x^3 - x + 3) dx = \\
 &= \left[-\frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 3x \right]_0^1 = -\frac{1}{6} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 = -\frac{2}{12} - \frac{3}{12} - \frac{6}{12} + 3 = -\frac{11}{12} + \frac{36}{12} = \frac{25}{12} \text{ τ.μ.}
 \end{aligned}$$


*** Σημείωση**

Η εξίσωση $x^5 + x^3 + x = 3$ έχει μοναδική λύση την $x=1$ γιατί η f είναι 1-1 και επομένως κάθε οριζόντια ευθεία, συνεπώς και η $y=3$ τέμνει τη C_f σε μοναδικό σημείο.

ΘΕΜΑ 4ο

α. Έστω (χωρίς βλάβη της γενικότητας) ότι $\gamma < \delta$. Τότε στο διάστημα $[\gamma, \delta]$ ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θ. Bolzano για την f , οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\gamma, \delta) \subseteq (\alpha, \beta)$ με $f(x_0) = 0$, άρα στο (α, β) η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (α, β) .

β. Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο (α, β) και $\alpha < x_0 < \beta$. Επομένως αφού $f(\alpha) = f(x_0) = f(\beta)$ στα διαστήματα $[\alpha, x_0]$ και $[x_0, \beta]$ ισχύουν για την f οι προϋποθέσεις του Θ. Rolle άρα υπάρχουν $x_1 \in (\alpha, x_0)$ με $f'(x_1) = 0$ και $x_2 \in (x_0, \beta)$ με $f'(x_2) = 0$. Από το Θ.Μ.Τ. του διαφορικού λογισμού στα διαστήματα $[\alpha, \gamma]$ και $[\delta, \beta]$ έχουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον



$\kappa_1 \in (\alpha, \gamma) \text{ με } f'(\kappa_1) = \frac{f(\gamma) - f(\alpha)}{\gamma - \alpha} = \frac{f(\gamma)}{\gamma - \alpha} \text{ και}$
 $\kappa_2 \in (\delta, \beta) \text{ με } f'(\kappa_2) = \frac{f(\beta) - f(\delta)}{\beta - \delta} = \frac{-f(\delta)}{\beta - \delta}$

Οπότε : $f'(\kappa_1) \cdot f'(\kappa_2) = \frac{-f(\gamma)f(\delta)}{(\gamma - \alpha)(\beta - \delta)} > 0$.

Επειδή $x_1 \in (\alpha, x_0)$ και $\kappa_2 \in (\delta, \beta)$ άρα $x_1 < \kappa_2$

• Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ. για την f' στο $[x_1, \kappa_2]$ υπάρχει $\xi_1 \in (x_1, \kappa_2)$ τέτοιο ώστε $f''(\xi_1) = \frac{f'(\kappa_2) - f'(x_1)}{\kappa_2 - x_1} = \frac{f'(\kappa_2)}{\kappa_2 - x_1}$

• Όμοια εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ. για την f' στο $[\kappa_1, x_2]$ υπάρχει $\xi_2 \in (\kappa_1, x_2)$ τέτοιο ώστε $f''(\xi_2) = \frac{f'(x_2) - f'(\kappa_1)}{x_2 - \kappa_1} = \frac{-f'(\kappa_1)}{x_2 - \kappa_1}$

Άρα : $f''(\xi_1) \cdot f''(\xi_2) = \frac{-f'(\kappa_2)f'(\kappa_1)}{(\kappa_2 - x_1)(x_2 - \kappa_1)} < 0$

Η τελευταία δηλώνει ότι οι $f''(\xi_1), f''(\xi_2)$ είναι ετερόσημες και χωρίς βλάβη, μπορούμε να θεωρήσουμε $f''(\xi_1) < 0$ και $f''(\xi_2) > 0$.

- γ. Από το β ερώτημα, εφαρμόζοντας το Θ. Bolzano για την f'' στο $[\xi_1, \xi_2]$ έχουμε: Η f'' είναι συνεχής στο $[\xi_1, \xi_2] \subseteq (a, b)$ οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\xi_1, \xi_2)$ τέτοιο ώστε $f''(x_0) = 0$.

Το σημείο x_0 θα ήταν σημείο καμπής της συνάρτησης εφόσον η f'' άλλαζε πρόσημο εκατέρωθεν αυτού. Όμως κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζεται από τα δεδομένα του θέματος.

Έπρεπε να δοθεί στα δεδομένα ναδειχθεί ότι υπάρχει ΠΙΘΑΝΟ σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .

**Επιμέλεια απαντήσεων
Ευάγγελος Σακαρικός
Μαθηματικός**