



**Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A.1. Έστω η πολυωνυμική εξίσωση $\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 = 0$, με ακέραιους συντελεστές. Αν ο ακέραιος $\rho \neq 0$ είναι ρίζα της εξίσωσης, να αποδείξετε ότι ο ρ είναι διαιρέτης του σταθερού όρου α_0 .

(8 Μόρια)

A.2. Άντε $\alpha > 0$ με $\alpha \neq 1$ τότε για οποιουσδήποτε $\theta_1, \theta_2 > 0$ να γράψετε τα αναπτύγματα των τύπων $\log_\alpha\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}\right)$ και $\log_\alpha(\theta_1 \theta_2)$ χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των λογαρίθμων.

(2 Μόρια)

A.3. Τι γνωρίζετε για την μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = \alpha^x$, $0 < \alpha \neq 1$.

(3 Μόρια)

A.4. Να γράψετε στο τετράδιό σας για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .

a. Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1453}{2011} \eta \mu(2x)$ έχει περίοδο :

$$\mathbf{A: } T = \pi + \frac{\pi}{4} \quad \mathbf{B: } T = \pi \quad \mathbf{C: } T = -2\pi$$

$$\mathbf{D: } T = \frac{\pi}{2} \quad \mathbf{E: } T = \frac{1453}{2011}$$

(2 Μόρια)

β. Το άθροισμα των συντελεστών του πολυωνύμου

$$P(x) = (x^4 - 3x^2 + 2x)^{15} - x^5 + 4x \text{ είναι :}$$

$$\mathbf{A: } 2^{15} + 4 \quad \mathbf{B: } 1 \quad \mathbf{C: } 3 \\ \mathbf{D: } 5 \quad \mathbf{E. } \text{κανένα από τα προηγούμενα.}$$

(2 Μόρια)

- γ. Αν S_v συμβολίζει το áθροισμα των πρώτων v óρων μιας γεωμετρικής προόδου (α_v) με λόγο $\lambda \neq 1$ και πρώτο óρο α_1 , τότε είναι :

$$\mathbf{A:} S_v = \alpha_1 \frac{\lambda - 1}{\lambda^v - 1} \quad \mathbf{B:} S_v = \alpha_1 \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1} \quad \mathbf{C:} S_v = \frac{\alpha_1 \lambda^v - 1}{\lambda - 1}$$

$$\mathbf{D:} S_v = \alpha_1 \frac{1 - \lambda^v}{\lambda - 1} \quad \mathbf{E:} \text{κανένα από τα προηγούμενα}$$

(2 Μόρια)

- A.5.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την éνδειξη **Σωστό** ή **Λάθος** δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

- α. Κάθε σταθερό μη μηδενικό πολυώνυμο είναι μηδενικού βαθμού.
(2 Μόρια)

- β. Η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \varepsilon \varphi x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = \frac{2}{\pi}$.
(2 Μόρια)

- γ. Η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \alpha^x \beta^x$ óπου $\alpha > 0$, $\beta > 0$ με $\alpha \neq 1$, $\beta \neq 1$ είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} , óταν $\alpha < \frac{1}{\beta}$.

(2 Μόρια)

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha \cdot \sin\left(\frac{\beta x}{2}\right)$ (1), óπου $\beta < 0$ και $\alpha \in \mathbb{R}$. Αν γνωρίζετε óτι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από τα σημεία $A(0, \beta + 5)$, και $B\left(\frac{4\pi}{\beta}, 4\beta^2\right)$ τότε:

- B.1.** Να αποδείξετε óτι $\alpha = 4$ και $\beta = -1$.

(7 Μόρια)

- B.2.** Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με την ευθεία $y=4$ στο διάστημα $[0, 12\pi]$.
(7 Μόρια)

- B.3.** Να βρείτε την μέγιστη και ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f καθώς και την περίοδό της.
(6 Μόρια)

B.4. Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων $A = f(4\pi) - f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ και

$$B = 3f(0) \frac{f(0)^{2010} - 1}{f(0) - 1} + 4$$

(5 Μόρια)

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται πολυώνυμο $P(x) = x^4 + \alpha x^3 - 7x^2 + \beta x + 2$, όπου α και β είναι πραγματικοί αριθμοί. Αν η διαίρεση του $P(x)$ δια $x - 1$ δίνει υπόλοιπο 1 και η αριθμητική τιμή του για $x = -2$ είναι 10, τότε:

Γ.1. Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(7 Μόρια)

Γ.2. Για τις τιμές $\alpha = -5$ και $\beta = 10$,

a. Να βρείτε το πηλίκο $\Pi(x)$ της διαίρεσης του $P(x)$ δια του $Q(x) = x^3 + x^2 - 2x$ και να γράψετε το $P(x)$ με την βοήθεια της ταυτότητας ευκλείδειας διαίρεσης.

(6 Μόρια)

b. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = v(x)$, όπου $v(x)$ το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ δια $Q(x)$.

(7 Μόρια)

γ. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $Q(x)$ βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' .

(5 Μόρια)

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln\left(\frac{4-x}{4+x}\right)$.

Δ.1. Να ορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να αποδείξετε ότι γραφική της παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

(5 Μόρια)

Δ.2. Να υπολογίσετε η τιμή της παράστασης

$$A = f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) + f(1) + f(2) + f(3)$$

(6 Μόρια)

Δ.3. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) - f(-x) < -2 \ln 3$.

(7 Μόρια)

Δ.4. Να λύσετε την εξίσωση $e^{2f(x)} + 3 = 4e^{f(x)}$.

(7 Μόρια)