

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)

ΤΑΞΗ:

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

## ΘΕΜΑ Α

A1. β

A2. α

A3. δ

A4. γ

A5. β

## ΘΕΜΑ Β

B1. a. Λ

β. Λ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

B2.

- 1) Η οργανική ένωση Α έχει μοριακό τύπο της μορφής  $C_xH_{2x+2}O$  που αντιστοιχεί σε κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη ή σε κορεσμένο αιθέρα. Οι αλκοόλες αντιδρούν με νάτριο, ενώ οι αιθέρες όχι και με βάση την εκφώνηση η Α είναι αιθέρας με συντακτικό τύπο :  $CH_3OCH_3$  (Α)
- 2) Η οργανική ένωση Β έχει μοριακό τύπο της μορφής  $C_vH_{2v}O$  που αντιστοιχεί σε κορεσμένη καρβονυλική ένωση, αλδεϋδη ή κετόνη.

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022**  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)

Στα αλκίνια  $C_vH_{2v-2}$  που έχουν  $v \geq 3$  η προσθήκη νερού οδηγεί τελικά σε σχηματισμό κετόνης, οπότε η Β είναι κετόνη με συντακτικό τύπο :



- 3) Στον μοριακό τύπο  $C_3H_8O$  αντιστοιχούν δύο κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες: η  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  που είναι πρωτοταγής και η  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ , που είναι δευτεροταγής.

Σύμφωνα με την εκφώνηση η Γ οξειδώνεται σε οξύ, είναι δηλαδή πρωτοταγής, οπότε έχει συντακτικό τύπο :  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  (Γ)

**B3.**

- a.  $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{H^+} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$
- β.  $\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{HCN} \longrightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$
- γ.  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons{H^+} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- δ.  $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O} + [\text{O}] \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$
- ε.  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{N} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{H^+ \text{ ή } \text{OH}^-} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3$

**B4.** Αρχικά σε δείγμα της χημικής ένωσης προσθέτουμε  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

Αν παρατηρήσουμε να ελευθερώνεται αέριο (είναι το  $\text{CO}_2$ ) τότε η ζητούμενη χημική ένωση θα είναι το προπανικό οξύ.

Αν δεν ελευθερώθει αέριο με την παραπάνω διαδικασία, τότε περίσσεια άλλου δείγματος της χημικής ένωσης προστίθεται σε όξινο διάλυμα  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  που έχει χρώμα πορτοκαλί. Αν το χρώμα του διαλύματος αλλάξει σε πράσινο, τότε η χημική ένωση οξειδώθηκε, οπότε είναι η 1-βουτανόλη.

Αν δεν παρατηρηθεί η παραπάνω χρωματική αλλαγή, σε νέο δείγμα της χημικής ένωσης προσθέτουμε Na. Αν παρατηρήσουμε να παράγεται αέριο, τότε η χημική ένωση είναι το 1-πεντίνιο το οποίο διαθέτει όξινο υδρογόνο και η χημική αντίδρασή του με νάτριο, ελευθερώνει αέριο υδρογόνο.

Αν δεν παρατηρηθεί έκλυση αερίου, τότε η χημική ένωση είναι το 1-πεντένιο.

**Παρατήρηση:**


Η παραπάνω διαδικασία είναι ενδεικτική, υπάρχουν και άλλες που είναι αποδεκτές για τη ζητούμενη διάκριση.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)

## ΘΕΜΑ Γ

Γ1.



Γ2. Η αντιστοίχιση είναι: A4, B1, Γ2, Δ3

Γ3.

α. Το ισομοριακό μείγμα περιέχει 0,1 mol από κάθε μια οργανική ένωση.

επομένως:  $\text{HCOOH} : 0,1 \text{ mol}$  και  $(\text{X}) \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 : 0,1 \text{ mol}$ Με το ανθρακικό άλας  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  αντιδρά σίγουρα το οξύ  $\text{HCOOH}$  και ίσως η οργανική ένωση  $(\text{X}) \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$  αν είναι και αυτή οξύ και όχι εστέρας.Το  $\text{HCOOH}$  αντιδρά με το  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στοιχειομετρίας:

mol	$2\text{HCOOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{HCOONa} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
αντιδρούν	0,1
παράγονται	- - 0,05

$$\text{V}(\text{CO}_2) = n \cdot V_m = 0,05 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \Leftrightarrow \text{V}(\text{CO}_2) = 1,12 \text{ L}$$

Ακριβώς όσα πραγματικά εκλύονται.

Άρα η χημική ένωση (X) είναι ο **εστέρας  $\text{HCOOCH}_3$** β. Το ζητούμενο ισομερές Ψ, είναι το  **$\text{CH}_3\text{COOH}$**  (αιθανικό οξύ).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)

## ΘΕΜΑ Δ

## Δ1.

- a. Έστω ω τα mol της αλκοόλης ( $\Sigma$ ) με μοριακό τύπο  $C_vH_{2v+1}OH$  και  $M_r=14v+18$ .

Από την στοιχειομετρία της αντίδρασης με νάτριο, έχουμε:

mol	$C_vH_{2v+1}OH$	+	Na	$\rightarrow$	$C_vH_{2v+1}ONa$	+	$\frac{1}{2} H_2 \uparrow$
αντιδρούν	$\omega$				-		-
παράγονται	-	-					$\omega/2$



$$n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_m} = \frac{2,24 L}{22,4 \frac{L}{mol}} = 0,1 \text{ mol} \Leftrightarrow \frac{\omega}{2} = 0,1 \Leftrightarrow \omega = 0,2 \text{ mol αλκοόλης } (\Sigma).$$

Για την αλκοόλη ( $\Sigma$ ) έχουμε:

$$m = 14,8 \text{ g} \Leftrightarrow \omega \cdot M_r = 14,8 \text{ g} \Leftrightarrow 0,2 \text{ mol} \cdot (14v + 18) \text{ g/mol} = 14,8 \text{ g} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 14v + 18 = 74 \Leftrightarrow 14v = 56 \Leftrightarrow v = 4$$

**Ο μοριακός τύπος της αλκοόλης ( $\Sigma$ ) είναι  $C_4H_9OH$**

- β. Οι ζητούμενοι συντακτικοί τύποι των αλκοολών είναι τέσσερις:




**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022**  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)

- γ. Αφού η αλκοόλη ( $\Sigma$ ) δεν αντιδρά με όξινο διάλυμα  $KMnO_4$ , είναι τριτοταγής. Από τις παραπάνω αλκοόλες η μοναδική τριτοταγής αλκοόλη, είναι η 4.

**Άρα η αλκοόλη ( $\Sigma$ ) έχει συντακτικό τύπο:**



**Δ2.**

- a. Έστω  $x$  τα mol του  $HC≡CH$  και  $\psi$  τα του αλκένιου  $C_vH_{2v}$  στο μείγμα.

$$n_{\text{ολικά}} = \frac{V_{\muειγμ}}{V_m} = \frac{4,48 L}{22,4 \frac{L}{mol}} \Leftrightarrow x + \psi = 0,2 \quad (1)$$

Με το Na αντιδρά το αιθίνιο και όχι το αλκένιο.

Από την στοιχειομετρία της χημικής αντίδρασης, έχουμε:



To 1 mol  $HC≡CH$  παράγει 1 mol  $H_2$

Ta  $x$  mol  $HC≡CH$  παράγουν  $x$  mol  $H_2$

$$n_{H_2} = \frac{m}{M_r} = \frac{0,2}{2} = 0,1 mol \quad \text{Οπότε } x = 0,1 \text{ και από την (1) : } \psi = 0,1$$

**Άρα το αρχικό μείγμα αποτελείται από 0,1 mol  $HC≡CH$  και 0,1 mol  $C_vH_{2v}$**

- β. Η ελάττωση της μάζας των καυσαερίων μετά την ψύξη, οφείλεται στην υγροποίηση των υδρατμών. Άρα η μάζα των υδρατμών που παράγονται από την καύση του μείγματος, είναι ίση με 9 g.

Από την πλήρη καύση του κάθε συστατικού του μείγματος, έχουμε:

Καύση αιθίνιου:

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022**  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Xλ2Γ(α)



To 1 mol HC≡CH παράγει 1 mol υδρατμών

Ta 0,1 mol HC≡CH παράγουν **0,1 mol υδρατμών**

Καύση αλκένιου:



To 1 mol C<sub>v</sub>H<sub>2v</sub> παράγει v mol υδρατμών

Ta 0,1 mol C<sub>v</sub>H<sub>2v</sub> παράγουν **0,1·v mol υδρατμών**

Συνολικά για τη μάζα των υδρατμών, ισχύει:

$$m = 9 \text{ g} \Leftrightarrow n_{\text{ολικά}} \cdot M_r = 9 \text{ g} \Leftrightarrow (0,1 + 0,1 \cdot v) \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = 9 \text{ g} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0,1 + 0,1 \cdot v = 0,5 \Leftrightarrow 0,1 \cdot v = 0,4 \Leftrightarrow v = 4$$


**Άρα ο μοριακός τύπος του αλκένιου είναι C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>**

γ. Στον μοριακό τύπο C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> αντιστοιχούν τρία συντακτικά ισομερή:

1. CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub>
2. CH<sub>3</sub>CH=CHCH<sub>3</sub>
3. CH<sub>3</sub>—C=CH<sub>2</sub>  
      |  
      CH<sub>3</sub>

Από τα παραπάνω ισομερή αλκένια, αυτά που δίνουν κύριο και δευτερεύον προϊόν κατά την αντίδραση με H<sub>2</sub>O, είναι το 1-βουτένιο (αλκένιο 1) και το μεθυλοπροπένιο (αλκένιο 3).

Το 2-βουτένιο δίνει ένα και μοναδικό προϊόν:



**Άρα ο συντακτικός τύπος του αλκένιου είναι CH<sub>3</sub>CH=CHCH<sub>3</sub>**